

Neue exotische Tomiceiden-Arten

diagnosticirt von

Oberförster *Eichhoff* in Hoeven.

Cryphalus Wapleri: *Breviter-oralis subdepressus*, thorace semicirculari disco subnodosa granulis dispersis ornato, basi utrinque depresso et subtilissime punctato; elytris subdepressis a basi ad apicem rotundatis, latitudine tertia parte vix longioribus, stria suturali basi profunde impressa, caeteroquin (subtilissime) substriatis, interstitiis setarum serie distincte ornatis. — Long. 1.5 millim.

Patria: Australia.

Cryphalus inops: *Breviter oralis*, subdepressus, hirtellus, thorace subovato, disco antice granulis dispersis ornato, postice subtilissime punctato; elytris lateribus leviter rotundatis, latitudine tertia parte fere longioribus, subtiliter subpunctato-striatis, interstitiis setarum serie ornatis, stria suturali basi non impressa. — Long. 2 millim.

Patria: Guadeloupe.

Cryphalus pallidus: *Fusco-testaceus*, subovalis, cylindricus, convexus, leviter squamulatus; thorace latitudine vix breviora a basi ad apicem leviter rotundatim angustato, apice granulis subacuminato, disco subnodoso, antice granulis dispersis exasperato, postice et lateribus subruguloso-punctato; elytris latitudine dimidio fere longioribus leviter striatis, interstitiis setis brevibus obtusis seriatim ornatis. — Long. 1.7 millim.

Patria: Madagascar.

Cryphalus robustus: *Amplus*, oblongus, cylindricus, hirtellus, piceus squamulis subtiliter adspersus, thorace semicirculari disco gibboso, antice granulis dispersis exasperato, postice et lateribus subtiliter dense punctato; elytris latitudine duplo fere longioribus fortiter punctato-striatis, punctis subquadratis, interstitiis subtilissime multipunctatis setisque elongatis subtilibus seriatim ornatis. — Long. 2—2.5 millim.

Patria: Amer. hor. (?)

Stephanoderes (nov. genus juxta *Cryphalus*).

Caput subglobosum, in thoracem retractum.

Tarsi articulis tribus primis simplicibus subaequalibus.

*Antennae funiculo 5-articulato, capitulo ab utroque facie un-
nulado, suturis ornato.*

Mentum subovatum, ligula angusta.

Maxillarum mala spinulis rigidis ciliata.

Die hierher gehörigen Arten (zu denen namentlich auch *Hypoborus* (?) *setosus* n. Berl. Entom. Ztschr. XI, 391. zählt) haben ganz das Ansehen von *Cryphalus*-Arten, von denen sie jedoch die 5gliedrige Fühlergeißel trennt; von *Hypoborus* weichen sie ab durch kugeligen Kopf, am Aufsenrand gekrümmte und mit Sägezähnen versehene Vorderschienen und an der Basis nicht erhaben gerandete Flügeldecken. Hierher gehören:

Stephanoderes elephas: Oblongus subovalis, nigro-piceus nitidulus, griseo-pilosus; thorace subgloboso longitudine latiore, lateribus a basi et apice rotundato, margine apicali in medio granulatis 1 prominulis submucronato disco subnodoso, granulorum reclinatorum congerie angusta exasperato, postice lateribusque granulato-punctato, ante scutellum spatio nitido ornato; elytris basi et apice subdepressis, post medium rotundatim angustatis et leniter declinibus, (supra) distincte punctato-striatis, interstitiis transversim rugulosis subtilissime multipunctatis setarumque obtusarum serie ornatis. — Long. 2,7 millim.

Patria: Isle de France.

Stephanoderes Chapuisii: Oblongus cylindricus, piceus elytris sordide brunneis, thorace subgloboso longitudine latiori, lateribus a basi et apice rotundato margine apicali in medio granulatis duobus prominulis submucronato. disco antice subnodoso granulorum reclinatorum congerie angusta exasperato, postice lateribusque subruguloso-punctato; elytris cylindricis lateribus a basi ad apicem rectis, dein subito convergentibus praecipitatisque profunde punctato-striatis interstitiis disperse squamulatis subtiliter multipunctatis setarumque serie ornatis. — Long. 2 millim.

Patria: America bor.

Stephanoderes opacus: Oblongus subcylindricus, opacus, piceo-brunneus, thorace subgloboso pulvinate lateribus a basi et apice rotundato, margine apicali granulatis duobus prominulis ornato, supra antice granulatis dispersis exasperato, postice subtiliter subgranulato-punctato; elytris parallelis striatis, striis subtiliter punctatis,

interstitiis subopacis setis obtusis et in declivitate rotundata granulatis minimis seriatim ornotis. — Long. 2 millim.

Patria: Nov. Granada.

Stephanoderes asperulus: Oblongus subovalis, nitidulus, niger, setis clavatis adpersus, thorace semicyptico versus apicem leniter rotundato longitudine tertia parte latiore, margine apicali granulatis 4 minutis ornato, disco rufescente antice granulatis disperse exasperato, postice ruguloso-punctato; elytris subparallelis profunde et dilatate punctato-striatis, interstitiis angustis tenuiter transversim rugulosis setisque clavatis seriatim ornatis. — Long. 1,7 millim.

In siliquis Cassiae de Reiche detectus.

Stephan. (Cryphalo) Hampei Ferrari valde affinis sed statura minore, magis cylindrico, thorace setis clavatis dignoscitur.

Stephanoderes pulverulentus: Subelongatus cylindricus, piceus, thorace semicyptico longitudine vix latiore setis squamulaeformibus cinereis adperso, margine apicali granulatis fere 6 prominulis ornato, disco antice tuberculis adperso, postice subtiliter granulato; elytris parallelis latitudine duplo longioribus nimis profunde et subdilatate punctato-striatis, interstitiis angustis squamulis cinereis seriatim ornatis. — Long. 1,5 millim.

Patria: Mexico.

Stephanoderes seriatus: Oblongus, thorace semicirculari longitudine latiori, sordide brunneo margine apicali granulatis 6 vel 8 prominulis ornato, disco gibboso antice tuberculis sparsis exasperato postice granulato-punctato; elytris latitudine tertia parte longioribus profunde et dilatate-punctato-striatis, interstitiis angustis rugulosis setisque cinereis obtusis seriatim ornatis. — Long. 1,3 mill.

Patria: Neu-Orleans.

Stephanoderes obscurus: Oblongus nitidus, thorace sordide brunneo semicyptico lateribus leniter rotundato, margine apicali granulatis multis ornato et disco subgibboso antice granulatis sparsis exasperato, postice granulato-punctato; elytris piceis subtiliter sed subdilatate striato-punctatis, interstitiis granularum serie ornatis; declivitate postica a medio elytrorum leniter convexa. — Long. 1,7 mill.

Patria: Antillen.

Hyllocurus (nov. gen.)

Caput subglobosum in thoracem reclinatum.

Antennae funiculo 6-articulato, capitulo oblongo-subgloboso, solido.

Manducarum mala intus setis rigidis ciliata.

Mentum subcordatum, palpi labiales articulo 1 longitudine sequentibus duobus consumtis majore.

Tibiae sublinearis. tarsi articulis 3 primis simplicibus, coxae approximatae.

Hylocurus elegans: Cylindricus brunneus, antennis testaceo-ferrugineis, thorace antice fortiter confertèque tuberculato, postice subtiliter granulato, lateribus punctato; elytris apicem versus leniter dilatatis, fortiter punctato-striatis, interstitiis transversim rugosis, internis octo apicem versus carinatis et in spinulam setiferam productis, declivitate postica disciformi, perfecte circulari eum parte horizontuli angulum rectum formante, sutura elevata granularum serie ornata et infra in spinam communem validam producta, retusionis fundo subradialim punctato, granulisque duobus a sutura aeque remotis ornato. — Long. 1,5 millim.

Patria: Teapa.

Xyloctonus (nov. gen. juxta *Cryphalum*).

Caput subglobosum, oculis bipartitis.

Antennae funiculo 6-articulato, capitulo imbricato circulari (suntis concentricis vix conspicuis).

Tibiae compressae, latae, extus rotundatae serratae, tarsi articulis 3 primis simplicibus.

Abdomen a basi versus apicem ascendens.

Maxillarum mala intus setis rigidis subhirtella.

Mentum oblongo-quadratum, palpi labiales articulo primo sequentibus duobus consumtis duplo majore.

Xyloctonus scolytoides: Oculis piceus (elytris immaturis testaceo-pallidis) opacus, thorace semicirculari pulvinate, disco congerie tuberculorum exasperato margineque antico medio bimucronato, lateribus et basi rugoso-punctato; elytris postice parum declivibus subdepressis sulcis latis profundis reticulato-punctatis, interstitiis angustis costatis levibus, sutura basi impressa. — Long. 2,2—2,5 mill.

Patria: Port Natal.

Xylocleptes uncinatus: Elongatus cylindricus, thorace lateribus leniter rotundatis, versus apicem convergentibus, antice granulis exasperato, postice ruditer aciculato-punctato; elytris lineato-punctatis interstitiis subaeque seriato-punctatis postice abrupte retusis, retusionis margine lateruli elevato, fundo fortiter punctato spinis utriusque binis supernis armato, spina secunda majore subrecurvata, sutura immuni. — Long. 2,5 millim.

Patria: Bogotà.

Pityophthorus infans: *Oblongus piceo-brunneus*, antennis ferrugineis, thorace breviter orato basi leviter marginato, lateribus antrosum convergentibus rotundato, ante medium constricto, disco antice granulis transversis exasperato, postice fortiter ruguloso-punctato, linea media levi; clytris subcylindricis subtiliter lineato-punctatis pilosisque, interstitiis punctorum serie ornatis: declivitate postica convexiuscula sublevi, integra, sutura rix elevata. — Long. 1,3 millim.

Patria: Amer. bor. (Civitat. unit.)

Pityophthorus corticalis: *Elongatus, brunneus*, thorace orato, latitudine longiore, lateribus rotundatis retrorsum divergentibus, antice granulis concentricis exasperato, postice ruditer granulato, linea media levi; clytris cylindricis usque ad apicem fortiter punctato-striatis, punctis dilatatis, interstitiis transversim rugosis; declivitate postica planiuscula immuni, punctato-striata, sutura rix elevata. — Long. 2 millim.

Patria: Chili.

Pityophthorus lautus: *Cylindricus ferrugineus*, thorace lateribus antrosum sensim convergentibus leniter rotundato, disco antice granulis concentricis exasperato, postice fortiter punctato, linea media levi; clytris fortiter punctato-striatis, interstitiis fortiter transversim rugulosis, declivitate retusa, interstitiis binis primis late sulcata. — Long. 1,3 millim.

Patria: Amer. bor.

Pityophthorus (?) *xylotrupes*: *Elongatus piceus*, antennis pedibusque ferrugineis, thorace orato lateribus, retrorsum sensim divergentibus, leniter rotundato, disco antice rugulis subimbricatis exasperato postice fortiter punctato, linea media basali levi; clytris lineato-punctatis, interstitiis basi punctis raris ornatis, stria suturali (a basi usque apicem) profundiore, retrorsum sensim sulcata, sutura postice rix elevata; fronte acute carinata. — Long. 2 mill.

Patria: Bahía.

Die Art hat, abweichend von den übrigen *Phyophthorus*-Arten, auf beiden Flächen der Fühlerkeule nur eine, in starkem Bogen nach vorn gerundete Nath.

Pityophthorus alienus: *Oblongo-oralis, ferrugineus*, thorace latitudine basali non longiore, lateribus a basi ad apicem leniter convergentibus rotundatisque, disco (omnino) granulato-exasperato; clytris rugulosis, lateribus rotundatis, ruditer striato-punctatis et setis squamulæformibus seriatim adpersis, interstitiis for-

titer lineato-punctatis. stria suturali a medio versus apicem profunde sulcato. — Long. 1,7 mill.

Patria: Brasilia.

Dryocetes meluenus: Subelongatus, nigro-piceus, antennis pedibusque obscure ferrugineis; thorace ovato, confertim granulato punctato, lineis mediis levi; elytris transversim subrugosis creberrime seriato-punctatis (interstitiorum punctis aequae profundis seriatisque); declivitate postica convexiuscula, interstitiis internis utrinque leviter impressis. — Long. 2 mill.

Patria: Brasilia.

Am nächsten wohl mit *Bost. affaber* Mann. verwandt, aber viel kleiner, von dunklerer Färbung, von anderer Form und besonders anderer Sculptur des Halsschildes.

Araptus (nov. gen.)

Tarsi articulis tribus primis simplicibus, tibiis lineares, apice truncatae.

Caput globosum, oculis (simplicibus) oblongis.

Antennae funiculo 5-articulato, capitulo maximo ovali, solido.

Mentum triangulare, ligula lanceolata acuminata apice summa subtilissime emarginata.

Maxillae mala intus setis rigidis ciliata.

Araptus rufopalliatus: Oblongus nitidus, glaber piceus, pedibus rufopiceis, antennis elytrisque pallide rufis, his margine externo scutelloque piceis; thorace, basi lateribusque marginato, oblongo, lateribus leviter rotundatis, versus apicem fortiter convergentibus, disco antice rugis subimbricatis asperato, pone medium subtiliter variis punctato; elytris vage punctatis, apice rotundatis, declivitate sutura elevata externeque granulata et setis seriatis ornata, interstitio secundo subretoso. — Long. 3 mill. Patria: Nov. Granada.

Xyloterus unicolor: Elongatus, cylindricus, piceo-brunneus, antennis, pedibus elytrisque testaceo-subbrunneis; thorace disco transversim subcallosa, antice exasperato, postice subtilissime uiculato-granulato; elytris unicoloribus, subtilissime lineato-punctatis, interstitiis confuse (fere biserialim) distincte punctatis; antennis capitulo circulari. — Long. 3 mill. Patria: Amer. hor. (Wisconsin.)

Die vorliegende Art paßt zu keiner der von Leconte (l. c. pag. 158 seq.) gegebenen Beschreibungen; höchstens könnte sie mit dem *X. politus* desselben Autors, von welcher Art mir keine Beschreibung vorliegt, zusammenfallen.